

Se trata de un [abordaje al tercer ventrículo](#), que requiere una detallada comprensión y dominio de los aspectos anatómicos y microquirúrgicos de la [fisura coroidea](#).

Esta técnica sigue una ruta natural y ciertamente la mejor opción al [III ventrículo](#).

Se realiza una craniotomía paramedial en posición decúbito supino, prefiriéndose el lado derecho o “no-dominante” para la retracción cerebral hemisférica.

Se identifica el [cuerpo calloso](#), que se incide previa disección y separación de la [arteria pericallosa](#)- en la unión de los 1/3 medio con el 1/3 anterior.

Esta incisión nos da acceso a la cavidad de Ventrículo Lateral Derecho, el cual reconoceremos por la dirección del Plexo Coroide y la [vena tálamoestriada](#) en relación al Foramen de Monro, que siempre debe estar en línea media izquierda, si estamos en el Ventrículo Lateral Derecho.

From:  
<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:  
[https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=abordaje\\_transcoroideo](https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=abordaje_transcoroideo)

Last update: **2025/05/13 02:01**

