

Adenoma de hipófisis epidemiología

El [adenoma de hipófisis](#), es la lesión [intrasealar](#) más común.

Representa el 10% a 25% de todas las [neoplasias](#) intracraneales (National Cancer Institute – Pituitary Tumors Treatment.

Available:<http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/pituitary/HealthProfessional> Accessed 2012 Dec 15).

El 60% son funcionales y el 40 % no funcionales.

En orden decreciente, los adenomas hipofisarios son el tercer tipo de tumor primario del sistema nervioso central, sumando casi el 17 % de las neoplasias intracraneales ¹⁾.

Afecta por igual a hombres y mujeres en la tercera y cuarta década de la vida (Couldwell, 2009).

Los adenomas hipofisarios son extremadamente raros en niños prepúberes (Furtado, 2010).

Los no funcionantes son mas frecuentes que los funcionantes y predominan los [prolactinomas](#) dentro de los funcionantes.

Coexistencia de aneurismas

La edad avanzada y la existencia de una invasión del seno cavernoso se correlacionaron con una mayor incidencia de aneurismas. En la serie de Oh y col., hasta en un 2.3% (Oh y col., 2012).

Sasagawa y col., 6,9 % (Sasagawa y col., 2012).

¹⁾

Weber M-A, Zoubaa S, Politi M, Grunwald I, Essig M (2007) [Sellar tumors] Der Radiologe; Springer Berlin/Heidelberg. 47(6): 492–500.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=adenoma_de_hipofisis_epidemiologia

Last update: **2025/03/10 15:03**

