

Anestésicos inhalatorios

Anestésicos generales, de carácter gaseoso o volátil que tras ser inhalado produce **anestesia general**.

Interfieren la **autorregulación cerebral** y pueden producir **vasodilatación** aumentando el **volumen sanguíneo cerebral**.

Muchos reducen el **metabolismo cerebral**, suprimiendo la actividad neuronal.

El **óxido nítrico** y los **anestésicos halogenados** son, posiblemente, los **anestésico general** más utilizados en todo el mundo en la práctica clínica habitual.

A pesar de la introducción de otros anestésicos inhalatorios (eteno, tricloroeteno, ciclopropano), el éter continuó siendo el anestésico general estándar hasta principios de 1960, para ser luego reemplazado por potentes y no inflamables agentes inhalatorios, como el **halotano**, seguido luego por el **enflurano**, y más adelante por el **isoflurano** hasta llegar, en la década de 1990, al **sevoflurano** y al más reciente **desflurano**.

Todos producen una reducción de la amplitud y aumento de latencia de los **potenciales evocados somatosensoriales**, que aumenta con el óxido nítrico.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=anestesicos_inhalatorios

Last update: **2025/03/10 15:19**

