




- 1 Nucleo caudado
- 2 Ventrículo lateral
- 3 Insula
- 4 Lóbulo temporal
- 5 Tálamo
- 6 Sulco lateral

Importancia

La importancia neuroquirúrgica radica en que su apertura quirúrgica mejora la exposición de las estructuras anatómicas en el [abordaje pterional](#), ya que abre la puerta de entrada al [espacio subaracnoideo](#) basal y el [círculo de Willis](#), que es esencial para el tratamiento de un número significativo de [aneurismas cerebrales](#).

La disección subaracnoidea medial se realiza desde el extremo distal de la cisterna silviana hasta proximal y cisterna carotídea.

En otras direcciones lateral, posterior, y superiormente permite la apertura del [opérculo](#).



Hemorragia cerebral en el **hipocampo** derecho de 19 x 12 mm que asocia gran componente de **hemorragia subaracnoidea**, más llamativo en **cisterna supraselar** y **cisterna ambiens** derecha, en la **cisura de Silvio**, en el **tercer ventrículo** y en el **ventrículo lateral** derecho. Además, también parece existir componente hemático en ambos agujeros de Monro.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=cisura_de_silvio

Last update: **2025/03/10 15:17**

