

Clínica de la hemorragia cerebral

La **clínica** va a depender de la **localización** , del **tamaño**, del **edema** acompañante y la presencia de **hidrocefalia** entre otros.

Característicamente se produce una **cefalea**, **vómito** y alteración en el **nivel de conciencia**.

Puede presentarse como **hemiparesia**, disminución de la apertura y desviación de los ojos hacia el lado del cerebro donde se produjo la hemorragia y dificultad para hablar. También puede manifestarse con una alteración para mover los ojos y disminución en la sensibilidad.

Uno de cada 4 pacientes va a presentar un deterioro clínico en las próximas 24 horas sobre todo en alcoholismo, hematoma irregular, nivel de conciencia bajo y niveles bajos de fibrinógeno. Antecedentes de isquemia cerebral, enfermedad hepática, niveles altos de glucosa, y tensión arterial por encima de 200 mm Hg.

Déficit neurológico focal de inicio rápido,

cefalea

náuseas,

vómitos(49%),

disminución precoz del nivel de conciencia (50%)

aumento de la presión arterial (90%)

Comienza habitualmente en vigilia.

| Localización | Síntomas Motores | Síntomas sensitivos | Movimientos oculares | Pupilas | Otros |
|-----------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| PUTAMEN | Hemiparesia / Hemiplejia contralateral | Pérdida de sensibilidad contralateral | Paresia de la mirada conjugada contralateral raramente ipsilateral | Normales | Hemianopsia homónima, afasia (izquierda). Negligencia o apractagnosia (derecha) |
| TÁLAMO | Hemiparesia contralateral | Pérdida de sensibilidad contralateral | Paresia de la mirada conjugada contralateral o ipsilateral, desviación hacia abajo de la mirada, alteración de la mirada hacia arriba, desviación oblicua, nistagmo de convergencia o retracción uni o bilateral, pseudoparálisis VI par | Pequeñas, débilmente reactivas | Afasia (izquierda) |
| PUENTE | Cuadriparesia, cuadriplejía, debilidad facial bilateral, síndrome de endaustramiento (locked in) | | Paresia de la mirada horizontal bilateral, movimientos verticales preservados, bobbing ocular | Puntiformes reactivas | Coma, hipertermia, hiperventilación |
| CEREBELO | Ataxia troncal de la marcha o de miembros. Debilidad facial ipsilateral | Pérdida de sensibilidad facial ipsilateral. Alteración del reflejo corneal. | Parálisis de la mirada conjugada ipsilateral, parálisis del abductor, desviación oblicua, nistagmo parético | Pequeñas, reactivas | Progresiva, signos sensitivos y motores bilaterales, coma. |
| FRONTAL | Hemiparesia contralateral | | Paresia de la mirada conjugada contralateral | Normales | Afasia (izquierda), abulia |
| PARIETAL | Hemiparesia contralateral | | Pérdida de sensibilidad contralateral | Normales | Hemianopsia homónima contralateral. Afasia (izquierda), apraxia, negligencia (derecha) |
| TEMPORAL | - | | | Normales | Hemianopsia homónima contralateral |

From: <https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link: https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=clinica_de_la_hemorragia_cerebral

Last update: **2025/03/10 14:47**

