

Crisis parcial

Clasificación

A. Simples (sin pérdida del estado de alerta o alteración en la función psíquica)

Motoras originadas en el lóbulo frontal ([tónicas](#), [clónicas](#), tónico-clónicas: jacksonianas; epilepsia benigna de la infancia; epilepsia parcial continua)

Somatosensoriales o sensoriales especiales (visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, vertiginosas)

Vegetativas

Psíquicas puras

A.- [Crisis parciales simples](#)

B. Complejas (con trastorno de la conciencia)

Inician como crisis parciales simples y progresan hasta afectar el estado de conciencia Con trastorno de la conciencia desde el principio

B.-[Crisis parciales complejas](#) (con compromiso del nivel de conciencia).

1 Parciales simples seguidas de parcial compleja.

2 Crisis parciales complejas desde el inicio.

C Crisis parciales complejas que evolucionan secundariamente a generalizadas.

Etiología

Las causas más frecuentes son la [esclerosis temporal medial](#) (ETM) y la [displasia cortical focal](#) (DCF)

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=crisis_parcial

Last update: **2025/03/10 14:53**

