

Displasia cortical

ver [Displasia cortical focal](#)

Las displasias corticales corresponden a un grupo heterogéneo de [malformacion del desarrollo cortical](#) (MDC), secundarias a una lesión durante los períodos de proliferación u organización cortical.

Aunque su etiología no se encuentra completamente dilucidada, estas lesiones se caracterizan por la presencia de neuronas y células gliales anormales en una región de la corteza cerebral.

La reoperación es especialmente beneficiosa para niños seleccionados con [epilepsia refractaria](#) asociada con displasia cortical que no responden a una resección limitada.

Cuando esté indicado, la reintervención se debe realizar a la edad más temprana posible sacando provecho de la mayor plasticidad funcional compensatoria del déficit neurológico ¹⁾

¹⁾

Ramantani G, Strobl K, Stathi A, Brandt A, Schubert-Bast S, Wiegand G, Korinthenberg R, Stephani U, van Velthoven V, Zentner J, Schulze-Bonhage A, Bast T. Reoperation for refractory epilepsy in childhood: a second chance for selected patients. *Neurosurgery*. 2013 Oct;73(4):695-704. doi: 10.1227/NEU.0000000000000081. PubMed PMID: 23842559.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=displasia_cortical

Last update: **2025/03/10 15:09**

