

Fractura vertebral cervical subaxial

La [fractura vertebral cervical subaxial](#) (por debajo de C2), constituye aproximadamente el 65% de las [fractura cervical](#) y más del 75% de todas las luxaciones.

A pesar de ello la clasificación y el tratamiento de las fracturas y luxaciones de la columna cervical sigue siendo controvertida.

Clasificación

Los sistemas se han basado en el mecanismo de la lesión por radiografías simples, sin tener en cuenta la contribución de los ligamentos en la estabilidad y sin las complicaciones neurológicas subyacentes.

Por otra parte, muchos sistemas son engorrosos y difíciles de aplicar: De hecho no existe un sistema único de uso generalizado.

Como resultado, la mayoría de las actuales clasificaciones presentan una terminología descriptiva para intentar ilustrar el patrón de fractura.

Sistemas de Clasificación

Allen y Ferguson

Harris

[SLIC de Vaccaro](#)

La clasificación de las lesiones cervicales subaxiales sigue siendo en gran parte descriptiva, sin estandarización ante cualquier relación con pronóstico o la toma de decisiones clínicas.

Una de las clasificaciones más aceptadas es la Subaxial Cervical Spine Injury Classification de [Vaccaro](#)

Sub-axial Injury Classification (SLIC)

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=fractura_vertеbral_cervical_subaxial

Last update: **2025/03/10 15:10**

