

Hemangioblastoma intracraneal

Hemangioblastoma

Epidemiología

Casi exclusivamente en la [fosa posterior](#) (es el [tumor primario intraaxial](#) más frecuente de la fosa posterior de los adultos). Se han publicado menos de 100 casos de ubicación supratentorial.

Representa entre 1,5% y 2% de los tumores endocraneanos; y entre 7% y 12% de los ubicados en fosa posterior. Pueden aparecer “espontáneamente”; o bien entre 10% y 30% de casos en un contexto de [enfermedad de Von Hippel Lindau](#).(vHL).

Clasificación

Según su localización

Lo más habitual es el [hemangioblastoma cerebeloso](#)

Una rareza es el hemangioblastoma supraselar ¹⁾.

Clínica

Clínicamente los hemangioblastomas cerebelosos se manifiestan con cefaleas, ataxia, edema papilar, y/o nistagmus; aislados o asociados. Es posible la aparición de síntomas durante la gestación o a posteriori de una derivación ventrículo peritoneal, por aumento en el volumen del hemangioblastoma a expensas de expansión en el componente vascular; e incremento en el riesgo de sangrado. Las complicaciones hemorrágicas son excepcionales, casi exclusivas del hemangioblastoma tipo 3 y caracterizadas por instalación ictal de síntomas.

¹⁾

Xie T, Zhang X, Hu F, Wang X, Wang J, Yu Y, Chen L. Suprasellar Hemangioblastoma Mimicking a Craniopharyngioma: Result of Extended Endoscopic Transsphenoidal Approach-Case Report. Neurol Med Chir (Tokyo). 2013 Sep 27. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24077270.

From:
<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=hemangioblastoma_intracraneal

Last update: **2025/03/10 14:43**

