

Hiperostosis esquelética difusa idiopática

La [hiperostosis](#) esquelética difusa idiopática es una enfermedad ósea difusa que se manifiesta por una tendencia a la osificación de los ligamentos, tendones, periostio y cápsulas articulares, que afecta tanto a la columna vertebral como a estructuras extraespinales.

En 1950 Forestier y Rotés-Querol publican una serie de 9 casos donde describen la hiperostosis anquilosante vertebral senil y la distinguen como entidad nosológica de la espondiloartrosis y la espondilitis anquilosante

En 1956 Forestier describe las localizaciones periféricas, perdiendo el calificativo de vertebral.

El posterior hallazgo de casos entre los 40-50 años hizo suprimir el calificativo de senil. No obstante forma parte de las cuatro enfermedades del envejecimiento articular junto a la osteoporosis, artrosis y condrocalcinosis.

A nivel vertebral se caracteriza por la osificación anterior y lateral del cuerpo vertebral .

Se ha descrito un caso de [síndrome medular central](#) en un paciente de un trauma menor que se trató quirúrgicamente ¹⁾.

Bibliografía

¹⁾

Eser, Olcay, Ergün Karavelioğlu, Mehmet Gazi Boyacı, and Abdullah Ayçiçek. 2013. "Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis and Central Cord Syndrome After Minor Trauma: a Case Report." *Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi = Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery: TJTES* 19 (1) (January): 73-76.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=hiperostosis_esqueletica_difusa_idiopatica

Last update: **2025/03/10 14:46**

