

Hoja operatoria de instrumentación XLIF

Bajo [anestesia general](#), [intubación orotraqueal](#) y [profilaxis antibiótica](#) con [cefazolina](#) 2 gr IV.

Colocación del paciente en [decúbito lateral](#) con rollo a nivel de flanco lumbar contralateral.

Planificación y localización radioscópica de espacio L2-L3.

Antisepsia cutánea con [Povidona yodada](#) al 10 %.

Incisión cutánea transversal sobre espacio previamente mencionado.

Disección roma de musculatura de oblicuo externo , oblicuo interno y transeverso.

Exposición grasa retroperitoneal.Espacio retroperitoneal desplazado anteriormente. Exposición psoas.

Colocación sistema MARS™ 3V Retractor

Identificación espacio discal y colocación de aguja de Kirschner y dilatación progresiva bajo MIO de plexo lumbar

Discectomia L2-L3 con ayuda de separador e instrumental de Globus Medical InterContinental Plate Spacer.

Colocación caja Intercontinental de 6 º de lordosis 40 x 20 x 8 rellena de Connexus.

Tornillos de 30 mm x 2.

Hemostasia de lecho quirúrgico. Fascia y subcutáneo con Vicryl. Piel con grapas.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=hoja_operatoria_de_instrumentacion_xlif

Last update: **2025/03/10 14:50**

