

Hoja operatoria de test de infusión

Mujer de 65 años, que acude para [cirugía ambulatoria](#) para realización de [test de infusión](#) por sospecha de [hidrocefalia crónica del adulto](#).

Bajo [anestesia local](#) con [lidocaina](#), y [profilaxis antibiótica](#) con [cefazolina](#) 2 gr IV.

Colocación del paciente en [decúbito lateral](#).

Antisepsia cutánea con [povidona yodada](#) al 10 %.

[Punción lumbar](#) entre L4/L5 a través de aguja [Spinocan](#) 19G y conexión a [llave de 3 pasos](#).

Se mide la presión de apertura con el paciente horizontal y relajado que es de 30 mm/Hg

Se conecta el sistema cerrado y el monitor de presión.

Se conecta la bomba de infusión con Ringer Lactato, después de confirmar una buena onda.

Velocidad de infusión es de un 1,6 ml/minuto. (96 ml/hora).

$\text{Rout} = (14 - 3) / \text{tasa de infusión (1,6 ml/min)} (\text{Pp: Presión ondas plateau Po: Presión apertura}) = 7,17$

Test negativo.

Recomendaciones

Reposo en cama hasta mañana. Mañana puede levantarse en su domicilio. Pasadomañana puede realizar sus actividades previas al test de infusión.

Solicitar fecha de revisión en consultas externas de neurocirugía Dr.xxxx

Debe seguir con su tratamiento médico habitual.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - Neurosurgery Wiki

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=hoja_operatoria_de_test_de_infusion

Last update: **2025/03/10 14:52**

