

Infarto maligno de la arteria cerebral media

El **infarto** maligno de la **arteria cerebral media** constituye un tipo específico y devastador de **ictus isquémico**. Usualmente afecta el territorio completo de la **arteria cerebral media**, aunque a veces involucra además otros territorios.

Clínica

Clínicamente se caracteriza por deterioro neurológico temprano y síndrome hemisférico severo. Su sello distintivo es el desarrollo de **edema cerebral** ocupante de espacio, entre el primer y tercer día del inicio de los síntomas. El efecto de masa provoca desplazamientos, distorsiones y **hernia cerebral**, aun en ausencia inicial de **hipertensión intracraneal**.

Epidemiología

El edema posisquémico ocurre en el 10-20% del infarto de la arteria cerebral media (ACM).

Tratamiento

[Tratamiento del infarto maligno de la arteria cerebral media.](#)

Pronóstico

El IHM tiene una morbilidad elevada.

Los pacientes que mueren a consecuencia de él suelen ser jóvenes y presentan infartos en el territorio completo de la ACM, aunque en ocasiones también se afecta el territorio de la arteria cerebral anterior y posterior. El edema produce **herniación transtentorial** y muerte a los 2-5 días del ictus.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=infarto_maligno_de_la_arteria_cerebral_media

Last update: **2025/05/13 02:09**

