Existen múltiples procesos patológicos que tienen predilección por el clivus como lugar de afectación. Esto podría ser debido a que se trata de una localización anatómica en la que asientan tejidos de distinta naturaleza (hueso, cartílago, restos de notocorda…) y a que se encuentra ricamente vascularizado.

Las lesiones que afectan al clivus, pueden ser diagnosticados incidentalmente mediante un TAC o una RM. La importancia de su detección radica en la posible afectación de estructuras vasculonerviosas vitales de la base del cráneo.

Podemos clasificar a estas lesiones en tumores originados primariamente en el clivus (cordoma, condrosarcoma,…); afectación tumoral secundaria o tumores paraclivales (metástasis, mieloma múltiple, carcinoma nasofaríngeo, linfoma, adenoma hipofisario, craneofaringioma, meningioma…), lesiones pseudotumorales (displasia fibrosa, ecchordosis physaliphora,…), lesiones inflamatorio-infecciosas (osteomielitis, mucocele, artritis reumatoide,…), lesiones vasculares (aneurismas vertebrobasilares),etc….

From:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/ - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:
**https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=lesion_del_clivus**

Last update: **2025/03/10 14:44**