

Manejo de la Coagulopatía en Hemorragia Intraparenquimatosa

El manejo adecuado de la coagulopatía en pacientes con hemorragia intraparenquimatosa es esencial para prevenir la expansión del hematoma y mejorar los resultados clínicos. Este protocolo detalla las estrategias y tratamientos recomendados para corregir trastornos de la coagulación en este contexto.

Identificación de la Coagulopatía

- **Evaluación Inicial:**

- Realizar un panel de coagulación completo, incluyendo tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPa), y niveles de fibrinógeno.
- Revisar la historia clínica del paciente para identificar el uso de anticoagulantes o la presencia de trastornos de coagulación preexistentes.

Manejo de Anticoagulantes

- **Antagonistas de la Vitamina K (Warfarina):**

- Administrar vitamina K por vía intravenosa para una reversión rápida.
- Considerar el uso de complejos protrombínicos concentrados (CPC) para una reversión más inmediata.

- **Inhibidores Directos del Factor Xa:**

- Utilizar agentes de reversión específicos como andexanet alfa para anticoagulantes como apixabán o rivaroxabán.

- **Inhibidores Directos de la Trombina:**

- Administrar idarucizumab para la reversión rápida de dabigatrán.

- **Heparinas:**

- Administrar sulfato de protamina para revertir los efectos de la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular.

Uso de Plasma y Crioprecipitados

- **Plasma Fresco Congelado (PFC):**

- Indicado para reponer múltiples factores de coagulación en pacientes con coagulopatía significativa.
- Administrar en casos donde los complejos protrombínicos no están disponibles o cuando se necesita una corrección más amplia de factores de coagulación.

- **Crioprecipitado:**

- Utilizar para aumentar los niveles de fibrinógeno en pacientes con hipofibrinogenemia.

Consideraciones Especiales

- **Monitorización Continua:**

- Realizar análisis de coagulación seriados para monitorear la efectividad y ajustar la terapia según sea necesario.

- **Evaluación de Riesgos y Beneficios:**

- Balancear los riesgos de hemorragia adicional contra el riesgo de trombosis inducida por la reversión de anticoagulantes.

- **Consultas Multidisciplinarias:**

- Involucrar a especialistas en hematología y cuidados intensivos para el manejo óptimo de casos complejos.

Este protocolo debe ser actualizado regularmente conforme a las últimas investigaciones y recomendaciones de las guías clínicas para asegurar la práctica más efectiva y segura.

From:
<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=manejo_de_la_coagulopatía_en_hemorragia_intraparenquimatosa

Last update: **2025/03/10 15:10**

