

Meningioma de la convexidad cerebelosa

Clasificación

- 1.- Una surge de la duramadre sobre la convexidad posterior del cerebelo
- 2.-Surge en el ángulo entre la duramadre y la convexidad petrosa y puede incluir la pared de los senos sigmoide y lateral.

Los meningiomas suelen estar separados de los nervios craneales por parenquima cerebeloso pero en tumores muy grandes puede haber sólo una fina capa de aracnoides.

Diagnóstico

La Resonancia cubre la mayor parte de las necesidades de información al cirujano.

La angiografía puede estar indicada para determinar el estado de los senos venosos.

Tratamiento

La cirugía está indicada cuando el paciente tiene síntomas neurológicos, generalmente dolor de cabeza o [síndrome cerebeloso](#) ^{1) 2)}

¹⁾

Ghosh K, Ghorai SP, Saha S, Roy S. Contralateral trigeminal neuropathy in a case of convexity cerebellar meningioma. J Indian Med Assoc. 2010 Sep;108(9):602-3. PubMed PMID: 21510535.

²⁾

Bhandari YS. Cerebellar convexity in meningioma in a child. (A case report). Neurol India. 1966 Apr-Jun;14(2):107-9. PubMed PMID: 5914953.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=meningioma_de_la_convexidad_cerebelosa

Last update: **2025/03/10 15:09**

