

Meningioma de ángulo pontocerebeloso

Tumor del ángulo pontocerebeloso.

Epidemiología

El **meningioma** del **ángulo pontocerebeloso** representa el 5 al 8% de todos los **meningiomas**.

Son los segundos más frecuentes, después del **schwannoma del nervio vestibular** que puede hallarse en esta región.


Se clasifican como subtipo de **meningioma de fosa posterior**.

La mayoría crecen a partir de las **granulaciones aracnoideas** de la cara posterior del **hueso petroso temporal**.

Los lugares frecuentes de asiento están en relación con los senos petrosos, superior e inferior, el seno sigmoide, el canal auditivo interno, el ápex petroso y el agujero yugular.

El crecimiento suele ser lento y el tumor está bien circunscrito, aunque en algunos casos se puede extender en placa a lo largo del hueso petroso. En aquellos casos que afectan a la cara inferior del tentorio pueden crecer hacia arriba y hacerse supratentoriales, invadiendo la fosa media, o bien crecer caudalmente hasta alcanzar el agujero magno e incluso llegar al canal espinal cervical.

Aquellos que penetran en el canal auditivo interno pueden invadir el laberinto o el oído medio.



From:
<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - Neurosurgery Wiki

Permanent link:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=meningioma_del_angulo_pontocerebeloso

Last update: **2025/03/10 14:49**

