

Meningioma supraselar

El [meningioma](#) representa alrededor del 1 % de las masas de la [silla turca](#).

A pesar de que pueden imitar al [adenoma de hipófisis](#) , es más vascularizado e invasivo.

En el estudio retrospectivo de Kwacharoen y cols. se identificaron 57 meningiomas. La relación mujer:hombre fue 06:01. La media de edad fue de 52 años (mediana 50 , rango 30-78). Los síntomas más frecuentes fueron trastornos visuales (58 %), cefalea (16 %) y el hallazgo incidental (12 %). La duración media de los síntomas fue de 13 meses. La hiperprolactinemia se encontró en 36 % , con valor medio de 51,6 ng / ml (mediana 41,8 , rango de 22,5 a 132). El diámetro medio de máxima fue de 2,9 cm (mediana 2,7 , rango de 0,9 a 6,8) , y la mayoría de los tumores captaban contraste de forma homogénea en la RM.

Tras la cirugía los trastornos visuales mejoraron en la mayoría de los pacientes (80 %), pero sólo en el 7 % la cefalea. Las complicaciones postoperatorias a 1 y 3 meses se produjeron en 38,6 y 33,3 % respectivamente. No hubo mortalidad ¹⁾

¹⁾

Kwacharoen R, Blitz AM, Tavares F, Caturegli P, Gallia GL, Salvatori R. Clinical features of sellar and suprasellar meningiomas. Pituitary. 2013 Aug 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23975080.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=meningioma_supraselar

Last update: **2025/03/10 14:48**

