

Con el término meningitis aséptica (MA) se denomina al síndrome clínico caracterizado por: cefalea, fiebre, signos menígeos y líquido cefalorraquídeo (LCR) de aspecto claro pero con pleocitosis linfocitaria y que se presenta como consecuencia de la inflamación de las leptomeninges (aracnoides y piamadre).

Implícita a la definición es la ausencia de signos de compromiso parenquimatoso (encefalitis) o inflamación de la médula espinal (mielitis).

La principal causa de la MA es la viral. Pero se debe tener en cuenta que ante un paciente con MA se debe plantear un diagnóstico diferencial

También se produce tras procedimientos de Neurocirugía, inyección Intratecal, anestesia espinal.

En neurocirugía es una complicación poco común causada por la fuga del contenido de un quiste en el espacio subaracnoideo (Koutourousiou et.al. 2011).

Bibliografía

Koutourousiou, Maria, y Andreas Seretis. 2011. Aseptic meningitis after transsphenoidal management of Rathke's cleft cyst: case report and review of the literature. Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology (Enero 14). doi:10.1007/s10072-010-0460-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234780>.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=meningitis_aseptica

Last update: **2025/03/10 15:11**

