

Tratamiento

Ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo (VET)

Complicaciones

Hidrocefalia puede ser comunicante u obstructiva.

La comunicante se trata mediante terapia médica, mientras que el tipo obstructivo requiere una intervención quirúrgica.

Las derivaciones tienden a obstruirse.

Aunque diversos autores han tenido una tasa de éxito de 65-68%, el fracaso ha sido bastante alto en los casos agudos, debido al engrosamiento de la pared del tercer ventrículo y anatomía distorsionada.

El uso de la VET en los casos subagudos y crónicos, parece justificado como primera línea de tratamiento (Bhagwati 2010).

Bibliografía

Bhagwati, Sanat, Nirav Mehta, y Suneel Shah. 2010. Use of endoscopic third ventriculostomy in hydrocephalus of tubercular origin. *Child's Nervous System: ChNS: Official Journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery* (Mayo 28). doi:10.1007/s00381-010-1183-1.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20508940>.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=meningitis_tuberculosa

Last update: **2025/03/10 15:17**

