

Metástasis pineal

La región pineal es un sitio inusual para el depósito de metástasis y la mayoría de las metástasis pineales son asintomáticas.

Aunque muy raramente, las metástasis deben considerarse en el diagnóstico diferencial de [tumores de la región pineal](#).

Fue reportado por primera vez en un paciente con carcinoma pulmonar.

Antes se solía encontrar en autopsias, pero más recientemente se detecta debido a un mejor diagnóstico por imagen, TAC y/o resonancia magnética.

Una revisión de la literatura sugiere que el carcinoma de pulmón es el tumor primario más frecuente. Concretamente el de células pequeñas.

Aunque se ha sugerido la propagación hematogena a la glándula pineal a través de la arteria coroidea posterior, el mecanismo de la metástasis todavía no está claro (Samanci y col., 2011)

Bibliografía

Samanci, Y, C Iplikcioglu, E Ozek, D Ozcan, and B Marangozoglu. 2011. "Lung carcinoma metastasis presenting as a pineal region tumor." Neurocirugía (Asturias, Spain) 22 (6) (December): 579-582.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=metastasis_pineal

Last update: **2025/03/10 14:50**

