

La meningitis causada por *N. subflava* es rara y la transmisión a través de un procedimiento médico es extremadamente rara.

En raras ocasiones es patógeno y puede ser la causa de una meningitis postoperatoria.

Se trata de un microorganismo comensal del tracto respiratorio superior que excepcionalmente se ha implicado en el desarrollo de infecciones graves, tanto en niños como en adultos.

Existen tres subespecies de *N. subflava* (biovars flava, perflava y subflava) pero la mayor parte de las publicaciones no distinguen entre subespecies y hacen referencia únicamente a *N. subflava*.

Hay un reporte de un caso de meningitis causada por *N. subflava* transmitido durante la mielografía en el cual el personal médico no usaba mascarillas durante el procedimiento.

Tras la colocación de una ventriculostomía tras una hidrocefalia aguda (Wakui y col., 2011).

Bibliografía

Wakui, D. et al., 2011. A case of meningitis due to *Neisseria subflava* after ventriculostomy. *Journal of Infection and Chemotherapy: Official Journal of the Japan Society of Chemotherapy*. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894453>

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=neisseria_subflava

Last update: **2025/03/10 15:13**

