

# Neuropatía óptica isquémica

La causa más frecuente de [pérdida de agudeza visual postoperatoria](#) es la Neuropatía Óptica Isquémica (NOI), que representa más del 80% de los casos publicados, de los cuales la gran mayoría son secundarios a [cirugía de columna](#) realizada en [decúbito prono](#)<sup>1)</sup>

El mecanismo de producción de la NOI permanece aún mal comprendido, habiéndose implicado numerosos factores predisponentes<sup>2)</sup>.

Falto de control de la glucemia

Posición de Trendelenburg

Hemodilución o sobreuso de [cristaloides](#)

Hipotensión prolongada

Perfusión renal disminuida

## Bibliografía

<sup>1)</sup>

Warner MA. Postoperative visual loss. Expert, data, and practice. Anesthesiology. 2006;105(4):641-2.

<sup>2)</sup>

Kamming D, Clarke S. Postoperative visual loss following prone spinal surgery. Br J Anaesth. 2005;95(2):257-60.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**



Permanent link:

[https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=neuropatia\\_optica\\_isquemica](https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=neuropatia_optica_isquemica)

Last update: **2025/03/10 15:02**