


Radiculopatía cervical

Es una enfermedad de la raíz nerviosa cervical, producida en la mayoría de los casos por una **hernia discal cervical** u osteofito en **uncus vertebral** en la mayoría de los casos.



A nivel cervical la raíz siempre sale por encima del **pedículo** de su nombre al revés de lo que sucede a nivel lumbar, por el mero hecho de que existen 8 raíces cervicales y 7 vértebras cervicales.

El espacio discal está en íntima relación a la porción inferior del pedículo al revés de lo que sucede a nivel lumbar.

Aunque el dolor lumbar es la afección más frecuente de la columna, el dolor cervical también es visto con frecuencia por los médicos de atención primaria y otros profesionales sanitarios que tratan problemas musculoesqueléticos.

Las raíces nerviosas cervicales C5, C6 y C7 son las que se ven comprometidas con mayor frecuencia y su afectación produce signos y síntomas característicos en las extremidades superiores. La prevalencia del dolor cervical de origen no traumático en EE.UU es del 10%.

La hernia discal más frecuente es C6-C7 seguida de C5-C6

Diagnóstico diferencial de la radiculopatía

Rotura manguito de rotadores

Tendinitis bicipital

Bursitis subacromial

Capsulitis adhesiva

Impingement

Polimialgia reumática

Dolores referidos en colecistitis...

Infarto de miocardio

Síndrome de dolor regional complejo

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=radiculopatía_cervical

Last update: **2025/03/10 15:16**

