

Recidiva tumoral

La recidiva es la reaparición del tumor tras un periodo más o menos largo de ausencia de enfermedad.

En función de dónde se localice, la recidiva puede ser:

Locorregional: en la misma zona donde estaba localizado el tumor de origen. Es frecuente que la nueva lesión aparezca en la cicatriz de la extirpación del tumor.

A distancia o metástasis: la enfermedad aparece en un órgano distinto al del tumor de origen.

El tratamiento en la recidiva es diferente a los de las otras etapas de la enfermedad y se definirá en función de:

Lugar de la recidiva.

Extensión de la recidiva.

Tiempo de evolución.

Tratamiento recibido anteriormente.

Decisión del enfermo y su familia (tras haber sido informados correctamente por su médico).

El conocimiento cada vez más exacto de la evolución y pronóstico de los diferentes tumores, así como la realización de revisiones periódicas de los pacientes aún estando libres de enfermedad, facilitan el diagnóstico de las recidivas y su más rápido y eficaz tratamiento.

La localización del tumor en la ínsula, opérculo, y el lóbulo temporal tiene una asociación significativa con la aparición de nuevas lesiones en difusión por resonancia magnética (DWI), por lo que la reintervención en pacientes con gliomas recurrentes puede llevar a un mayor riesgo de infarto post-operatorio o déficit neurológico nuevo (Dützmänn y col., 2012).

La RM con gadolinio es extremadamente valiosa para evaluar el tumor residual de los [gliomas de alto grado](#) durante los días 1 a 3 después de la resección y así poder estimar la recidiva de los restos tumorales (Albert y col., 1994).

Diagnóstico diferencial

[Pseudoprogresión tumoral](#)

Bibliografía

Albert, F K, M Forsting, K Sartor, H P Adams, and S Kunze. 1994. "Early Postoperative Magnetic Resonance Imaging After Resection of Malignant Glioma: Objective Evaluation of Residual Tumor and Its Influence on Regrowth and Prognosis." *Neurosurgery* 34 (1) (January): 45-60; discussion 60-61.

Dützmänn, Stephan, Florian Geßler, Andrea Bink, Johanna Quick, Kea Franz, Volker Seifert, and Christian Senft. 2012. "Risk of ischemia in glioma surgery: comparison of first and repeat procedures." *Journal of Neuro-Oncology* (January 17). doi:10.1007/s11060-011-0784-1.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22249690>.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=recidiva_tumoral

Last update: **2025/03/10 15:04**

