

Se refiere a todos los schwannomas intracraneales que no nacen del nervio vestibular.

Trigémino

Hipogloso

Abductor

Facial

Patético

Motor ocular común

Glosofaríngeo

Yugular.

La vía endoscópica endonasal proporciona un acceso adecuado para este tipo de schwannomas que invaden la base del cráneo, lo que permite un alto grado de resección con una baja tasa de complicaciones (Shin y col., 2011).

También la cirugía Gamma Knife es una opción de tratamiento razonablemente eficaz para ellos (Elsharkawy y col., 2011), se puede obtener una tendencia hacia la disminución de las complicaciones con múltiples sesiones (Choi y col., 2011).

Bibliografía

Choi, C.Y.H. et al., 2011. Stereotactic radiosurgery of cranial nonvestibular schwannomas: results of single- and multisession radiosurgery. *Neurosurgery*, 68(5), págs.1200-1208; discussion 1208.

Elsharkawy, M. et al., 2011. Gamma Knife surgery for nonvestibular schwannomas: radiological and clinical outcomes. *Journal of Neurosurgery*. Available at:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21962159>

Shin, S.S. et al., 2011. Endoscopic endonasal approach for nonvestibular schwannomas. *Neurosurgery*, 69(5), págs.1046-1057.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=schwannomas_no_vestibulares

Last update: **2025/03/10 14:47**

