2025/07/02 13:18 1/1 tension de cizallamiento

La tensión de cizallamiento es un factor importante para discriminar la ruptura de un aneurisma.

Se define como la fuerza, por unidad de área, que el flujo sanguíneo ejerce en la pared vascular, y depende de la viscosidad sanguínea y del perfil de velocidad del flujo sanguíneo. Las unidades de medida se expresan en dinas/cm² y los valores fisiológicos en el sistema venoso oscilan entre 1 y 6 dinas/cm², mientras que en el sistema arterial son \geq 10-15 dinas/cm².

Los aneurismas rotos se manifiestan con tensiones inferiores, mayor porcentaje de áreas de tensión de cizallamiento bajas, por lo que la hemodinámica es tan importante como la morfología para discriminar la ruptura del aneurisma (Xu y col., 2013).

Bibliografía

Xu, Jinyu, Ying Yu, Xi Wu, Yongfa Wu, Che Jiang, Shengzhang Wang, Qinghai Huang, and Jianmin Liu. 2013. "Morphological and Hemodynamic Analysis of Mirror Posterior Communicating Artery Aneurysms." PloS One 8 (1): e55413. doi:10.1371/journal.pone.0055413.

From:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/ - Neurosurgery Wiki

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=tension_de_cizallamiento

Last update: 2025/03/10 14:47

