

Tumor de ventrículo lateral

En el 10% de los casos son incidentales.

Clínica

La duración media de los síntomas es corta en el tiempo (2 meses).

Las lesiones sintomáticas se caracterizan por aumento de la [presión intracraneal](#) (PIC) (por [hidrocefalia](#)) y signos neuropsicológicos.

Sólo un tercio de los pacientes no tienen trastornos de la circulación del LCR.

Los dos tumores más frecuentes son los [meningiomas](#) (40 casos, 15%) y los [neurocitomas](#).

El [astrocitoma subependimario de células gigantes](#), los [ependimomas](#) y los [subependimomas](#) también son comunes (11, 10 y 9% respectivamente).

Pronóstico

Los déficit neuropsicológicos fueron las secuelas más frecuentes (22,8%) debido a la elevación de la PIC. [Déficit campimétrico](#) (19%), [convulsiones](#) (19%), [hemiparesia](#) (15%) y trastornos del lenguaje (12%).

El seguimiento medio fue de 52 meses, con buena evolución el 58% de los pacientes. El quince por ciento de los pacientes tenían un déficit, con una mortalidad del 12,9%.

Dos tercios de los pacientes no tenían restos ni recidiva (Baroncini y col., 2011).

Tratamiento

[Abordaje interhemisférico](#)

Bibliografía

Baroncini, M. et al., 2011. [Tumors of the lateral ventricle. Review of 284 cases.]. Neuro-Chirurgie. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22032889>

From:
<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:
https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=tumor_de_ventriculo_lateral

Last update: **2025/03/10 15:09**



