

Tumor frontal clínica

La [cefalea](#) es uno de los [síntomas](#) más frecuentes, pero los trastornos en la esfera mental caracterizan esta localización mucho antes que los síntomas de [hipertensión intracraneal](#), aun cuando estos tumores hayan alcanzado grandes dimensiones; ocurren alteraciones de la personalidad con desórdenes de tipo psiquiátrico, rápidamente el paciente entra en un estado de [depresión](#), o puede presentar síntomas de [demencia](#) progresiva que en los ancianos puede catalogarse como una demencia senil evolutiva de otra causa.

La capacidad intelectual suele ser la más afectada, se pierde la capacidad de autocrítica y la [moria](#) es frecuente, estos trastornos son generalmente de progresión rápida, y la anamnesis tiene gran importancia para el diagnóstico clínico.

Las [convulsiones](#) pueden presentarse hasta en un 50% de los casos con trastorno del lenguaje que se traduce en sentir deseos de hablar sin poder hacerlo.

La [afasia](#) de expresión ocurre cuando el tumor afecta la parte posterior de la circunvolución frontal anterior.

La compresión de las fibras piramidales puede producir [hemiparesia](#) contralateral, preferentemente a predominio facio- braquial.

ver [parálisis facial](#).

La compresión del nervio olfatorio produce anosmia del lado del tumor: si comprime el nervio óptico de un lado produce atrofia óptica en éste y edema papilar en el otro lado ([síndrome de Foster Kennedy](#)), el paciente también puede presentar [ataxia](#) de tipo frontal.

Mareo.

Alteraciones en el lenguaje.

Alteraciones de la [memoria](#).

Alteraciones de la personalidad.

Pérdida de olfato.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=tumor_frontal_clinica

Last update: **2025/03/10 14:51**

